MEDIAENERGIE Gel

Gel oral pour la réduction du risque de cétose chez la vache laitière

Composition pour 500 ml

Monopropylène glycol	350 g	Vitamine B2	37 mg
Sorbitol	50 g	Vitamine B5	150 mg
Vitamine A	100 000 UI	Vitamine B6	18 mg
Vitamine D3	20 000 UI	Vitamine B9	10 mg
Vitamine E	500 mg	Vitamine B12	5 mg
Vitamine PP	9 g	Vitamine C	500 mg
Vitamine B1	100 mg		

Propriétés

Source d'énergie glycogénique après vêlage et au démarrage de la lactation.

- le *monopropylène glycol* transformé en acide propionique dans le rumen est un précurseur du glucose rapidement assimilable,
- le *sorbitol* joue le rôle d'hyperglycémiant et permet la réduction de la production d'insuline,
- la *vitamine A* est la vitamine de l'immunité par excellence,
- la *vitamine D3* est indispensable au métabolisme du calcium,
- la *vitamine E* est un antioxydant biologique. Elle joue un rôle important dans la prévention des rétentions placentaires (non délivrance),
- la *vitamine PP* diminue la lipolyse du foie et ralentit la lipomobilisation des graisses corporelles. Elle augmente la quantité de protéines microbiennes et la quantité de propionate,
- la *vitamine B1* joue un rôle important dans tout le métabolisme énergétique. Elle est nécessaire à la formation d'une enzyme qui permet l'assimilation des glucides. Elle est fondamentale dans le fonctionnement du système nerveux central,
- la *vitamine B2* intervient dans la chaîne respiratoire assurant le transport de l'oxygène dans l'organisme,
- la *vitamine B5* joue un rôle essentiel dans l'interconversion entre acides gras, glucides et acides aminés,
- la *vitamine B6* joue un rôle important dans la mobilisation du glycogène hépathique et intervient dans les contractions cardiaques et musculaires. Elle joue un rôle important dans la constitution de l'hémoglobine,
- la *vitamine B9* est indispensable au métabolisme des protéines et à la division cellulaire, elle est indispensable à la régénération de la méthionine,
- un carence en *vitamine B12* diminue la quantité de méthionine disponible par l'animal et cause une déficience secondaire en acide folique. La vitamine B12 intervient dans le métabolisme du propionate; lors de sa carence, le propionate provenant des fermentations ruminales ne peut plus être transformé en glucose,
- la *vitamine C* intervient dans la synthèse des hormones corticosurrénales et joue donc le rôle d'antistress.

Utilisation

Réduction du risque de cétose (acétonomie) et récupération favorisée

Mode d'emploi

Administrez un flacon de 500 ml par vache. A renouveler 12 heures après la 1ère administration.
Si l'animal ne récupère pas suffisamment vite, deux nouvelles administrations sont nécessaires.

Distribution par voie orale : maintenir la tête de l'animal en hauteur et introduire l'extrémité du flacon dans la gueule de la vache. Veiller durant l'administration progressive du flacon à une bonne déglutition de l'animal.

Catégorie

Produit à objectif nutritionnel particulier

Conservation

24 mois à compter de la date de fabrication

Code produit

10 120

5 Place des Vosges – 56 860 SENE – FRANCE – Tél. (33) 2 97 68 81 22 – Fax (33) 2 97 68 86 14
XERIS S.A. au capital de 68 602,06 Euro – RCS Vannes B 420 090 268 00012 – APE 157 A